

Stofnuglahópar af tegund hænsnflugl, kalkún, endur og gæsir:

uppfært 23. október 2008

Plan:

Framleiðsla	Sýnatökutíma	Sýnatökustaður	Sýnataka	Sýni tekið af framleiðanda	Sýni tekið af MAST
Uppeldi	Útungun Skv. EC 2160/2003	Útungunarstöð sóttkví	- Eggjaskurn 10g úr 25 útungunarkörfum, samtals a.m.k. 250g per hóp (hana- og hænulína) =>25g rannsóknarsýni per hóp. Eða: - Kassaklæðing eða stroksýni (>1m ² samtals) úr 5 útungunarkörfum = 1 safnsýni (per hóp).		Alltaf
	4 vikna aldur Skv. EC 2160/2003	Uppeldishús sóttkví	Skóhlífasýni 2 pör (boot swabs) = 1 safnsýni per hóp	Alltaf	
	8 vikna aldur (12-14 v. aldur)	Holdastofnuglahópurinn fluttur út úr sóttkví í uppeldishúsin Varpstofnuglahópurinn fluttur út úr sóttkví yfirleitt beint í varphúsið við 12 – 14 vikna aldur			
	2 vikur fyrir flutning í varphúsið Skv. EC 2160/2003	Uppeldishús	Skóhlífasýni 2 pör = 1 safnsýni per hóp	Alltaf	
Valkostur 1- Býli Fullorðnir hópar	Á tveggja vikna fresti (á varptímabilinu) Skv. EC 2160/2003 og EC 1003/2005	Varphús	Skóhlífasýni 5 pör = 2 safnsýni per hóp (eða 2 x 150g saursýni hjá búrfuglum = 2 safnsýni per hóp)	Alltaf, nema þegar MAST tekur sýni	3-svar á tímabilinu: 0-4 vikna eftir flutning, 8-0 vikur fyrir lok framleiðslutíma og einu sinni á milli

<p>Valkostur 2 - Útungun Fullorðnir hópar</p>	<p>Á tveggja vikna fresti</p> <p>Skv. EC 2160/2003 og EC 1003/2005</p>	Útungunarstöð	<p>- Eggjaskurn 10g úr 25 útungunar-körfum, samtals a.m.k. 250g per hóp =25g rannsóknarsýni per hóp. -Eða kassaklæðning eða stroksýni úr 5 körfum (>1m² samtals), = 1 safnsýni per hóp.</p>	Alltaf, nema þegar MAST tekur sýni	Á 16 vikna fresti í útungun
	<p>0-4 vikur eftir flutning</p> <p>Skv. EC 2160/2003 og EC 1003/2005</p>	Varphús	<p>Skóhlífasýni 5 pör = 2 safnsýni per hóp</p> <p>(eða 2 x 150g saursýni hjá búfuglum)</p>		Alltaf
	<p>8-0 vikur fyrir lok framleiðslutima</p> <p>Skv. EC 2160/2003 og EC 1003/2005</p>	Varphús	<p>Skóhlífasýni 5 pör = 2 safnsýni per hóp</p> <p>(eða 2 x 150g saursýni hjá búfuglum)</p>		Alltaf
	<p>Jákvæð sýni í útungunarstöð</p> <p>Skv. EC 2160/2003 og EC 1003/2005</p>	Varphús	<p>Skóhlífasýni 5 pör = 2 safnsýni per hóp og dauðir fuglar fyrir sýklalyfjaleit (eða 2 x 150g saursýni hjá búfuglum)</p>		Alltaf

Varphænur:

Plan:

Framleiðsla	Sýnatökutíma	Sýnatökustaður	Sýnataka	Sýni tekið af framleiðanda	Sýni tekið af MAST
Uppeldi	Útungun Skv. EC 2160/2003	Útungunarstöð	- Eggjaskurn 10g úr 25 útungunar-körfum, samtals a.m.k. 250g per hóp =25g rannsóknarsýni per hóp. -Eða kassaklæðning eða stroksýni úr 5 körfum (>1m ² samtals) = 1 safnsýni per hóp.	Alltaf	
	2 vikur fyrir flutning í varphúsið Skv. EC 2160/2003	Uppeldishús	150g saursýni hjá búrfuglum eða skóhlífasýni 2 pör = 1 safnsýni per hóp	Alltaf	
Varphænur	Á 15 vikna fresti (1. sýnataka á aldrinum 22-26 vikna) Skv. EC 2160/2003 og EC 1168/2006	Varphús	2x150g saursýni hjá búrfuglum eða skóhlífasýni 2 pör = 2 safnsýni per hóp. MAST sýnataka: 1 af 2 sýnum á að vera ryksýni amk. 100g (250ml)	Alltaf, nema þegar MAST tekur sýni	1 sýni árlega úr einu hópi hjá hverjum framleiðanda >1000 fuglar.
	22 – 26 vikur Skv. EC 2160/2003 og EC 1168/2006	Varphús	Ryksýni amk. 100g (250ml) og 150g saursýni hjá búrfuglum eða ryksýni amk. 100g (250ml) og skóhlífasýni 1 par = 2 safnsýni per hóp		Úr hópi ef undanfarandi hópur í húsinu var salmonella-jákvæður
	Við jákvæða salmonellu-greiningu Skv. EC 2160/2003 og EC 1168/2006	Varphús	Ryksýni amk. 100g (250ml) og 150g saursýni hjá búrfuglum eða ryksýni amk. 100g (250ml) og skóhlífasýni 1 par = 2 safnsýni per hóp		Úr öllum hópum á búi þar sem salmonella spp. hefur greinst og eins þegar ástæða þykir til.

Kjúklingar, kalkún, endur og gæsir:

Plan:

Framleiðsla	Sýnatökutíma	Sýnatökustaður	Sýnataka	Sýni tekið af framleiðanda	Sýni tekið af MAST
Eldi	7-21 dagar fyrir slátrun. (Að jafnaði við tveggja til þriggja vikna aldur úr kjúklingum) Skv. EC 2160/2003 og EC 646/2007	Eldishús	Skóhlífasýni 2 pör = 1 safnsýni per hóp Ekki má slátra eldishópi fyrir en niðurstöður rannsókna liggja fyrir.	Alltaf nema þegar MAST tekur sýni	Árlega úr a.m.k. einum eldishópi á 10% búa (>5000 fugla), Sýnataka skv. áhættumati.

Sláturhús:

Sýnatökustaður	Sýnataka	Sýni tekið af framleiðanda	Sýni tekið af MAST
Á sláturlínu	50 hálsaskinnssýni hámark 5g = 1 safnsýni.		Alltaf

Í öllum tilvikum þegar alifugli er slátrað skulu liggja fyrir niðurstöður salmonellu-rannsókna úr eldisýnum sem ekki eru eldri en þriggja vikna.